

Llama Secretaría de Salud a reforzar medidas preventivas contra el Gusano Barrenador del Ganado

- Al momento no se han detectado casos en humanos en Chihuahua

La Secretaría de Salud exhorta a la población a reforzar medidas de protección e higiene personal, principalmente en zonas rurales y en lugares donde existe contacto frecuente con ganado, animales domésticos o fauna silvestre, como parte de las acciones preventivas contra el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).

Al momento no se han detectado en seres humanos en el estado de Chihuahua. Sin embargo, ante la confirmación reciente de su presencia en animales en la entidad, se debe mantener vigilancia permanente y acudir a los servicios médicos ante cualquier señal de alerta.

El primer caso en ganado en Chihuahua fue confirmado el 14 de julio de 2026, y motivó acciones puntuales de saneamiento y atención en las zonas cercanas al sitio de detección.

El GBG es la larva de una mosca que deposita sus huevos principalmente en heridas abiertas o en orificios del cuerpo. Al eclosionar penetran en la lesión y se alimentan del tejido vivo, lo que puede ocasionar dolor, inflamación, sangrado, mal olor y el deterioro progresivo de la herida.

Aunque la mayoría de las infestaciones se presentan en animales de sangre caliente, también pueden afectar a las personas, por lo que la dependencia recomienda lavar cualquier herida, raspón, picadura, cortadura o lesión en la piel, mantenerla limpia y cubierta, aun cuando sea pequeña.

También utilizar ropa de manga larga, pantalón, sombrero y calcetines cuando se realicen actividades al aire libre, además de aplicar repelente de insectos y colocar mallas o mosquiteros en ventanas y espacios de descanso.

Las personas que trabajan o conviven con ganado, mascotas u otros animales, deben revisar periódicamente que estos no presenten heridas con secreción, mal olor, sangrado o larvas visibles.

Ante cualquier lesión sospechosa en un animal, se debe evitar manipularla sin protección y solicitar inmediatamente la valoración de un médico veterinario, además de notificar a las autoridades de sanidad animal correspondientes.

Se debe acudir de inmediato a la unidad médica más cercana cuando una herida aumente de tamaño rápidamente, haya dolor intenso, inflamación, secreción, sangrado, olor desagradable o sensación de movimiento y cuando se observen larvas en la piel, ojos, nariz, boca u oídos.

No se debe intentar extraer las larvas ni aplicar remedios caseros, ya que el tratamiento requiere valoración y atención por personal de salud.

La detección oportuna y la colaboración entre la población, personal de salud, productores, veterinarios y autoridades sanitarias, son fundamentales para reducir riesgos y proteger la salud de la ciudadanía.