

Mantiene SDR capacitaciones a productores para actuar ante posibles casos de GBG

Como parte de las acciones de prevención y atención ante la emergencia sanitaria por el Gusano Barrenador del Ganado (GBG), la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) mantiene capacitaciones dirigidas a productores de distintas regiones del estado.

Dichas actividades tienen como objetivo brindar los conocimientos y herramientas necesarios, para identificar señales de alerta, atender heridas y realizar la correcta toma de muestras, ante casos sospechosos.

Además se les orienta sobre la importancia de revisar constantemente a los animales, detectar heridas sospechosas y reportar cualquier posible caso, así como el procedimiento para recolectar muestras de larvas y contribuir a un diagnóstico oportuno.

Entre las principales señales de alerta se encuentran heridas que no cicatrizan, sangrado o secreción con mal olor, presencia de larvas o “gusaneras”, lamido excesivo, picazón o irritación, así como disminución de peso o falta de apetito.

Las lesiones pueden presentarse en sitios como el ombligo, orejas, castraciones, descorne, heridas, picaduras de garrapata, vulva y otras aberturas corporales.

Ante una herida sospechosa, se recomienda:

1. Tomar fotografías con georreferencia de la herida, del animal completo y de su entorno
2. Separar al animal con la gusanera en un lugar limpio, seco y protegido, para evitar que otras moscas tengan contacto con la herida
3. Limpiar cuidadosamente la herida con yodo povidona o clorhexidina
4. Tomar la muestra de larvas y recolectar de 10 a 12 ejemplares por muestra, preferentemente de diferentes partes de la herida, con pinzas o cucharilla
5. Desechar de manera segura las larvas restantes, para evitar que caigan al suelo. Se recomienda colocarlas en una botella o bolsa de plástico cerrada para su disposición adecuada. La SDR reparte kits que incluyen un contenedor para depositarlas
6. Realizar la curación de la herida con el producto recomendado por el médico veterinario
7. Mantener en observación al animal tratado durante al menos siete días y revisar que la herida mejore y no aparezcan nuevas gusaneras

Como parte de las recomendaciones compartidas durante la capacitación, la SDR exhorta a los productores a revisar diariamente o de manera periódica a los animales de granja y mascotas, establecer calendarios de vacunación, desparasitación y control de ectoparásitos.



Además se debe acudir con un médico veterinario de confianza, cuando se desconozca el origen o tratamiento de alguna enfermedad.

La dependencia reitera el llamado a reportar de inmediato cualquier animal con gusaneras o sospecha de GBG, ya que la detección temprana permite actuar de manera oportuna y contribuir a la protección de la sanidad animal en Chihuahua.